

تشخیص مصرف مواد مخدر در نوجوان



در یک نوجوان تشخیص رفتارهای ناشی از
درگیر شدن با مصرف مواد مخدر ، کاری
بسیار دشوار است .

زیرا بسیاری از این رفتارها کاملاً " مشابه تغییرات
رفتارهای معمولی دوره نوجوانی است .

رفتارهای مشکوک کننده

اگر مجموعه ای از برخی رفتارها مکرر دیده شده
می تواند والدین را به احتمال مصرف مواد در نوجوان
مشکوک کند .

رفتارهای مشکوک کننده

- ۱ - رفتارهای بی ثبات و غیرقابل پیش بینی
- ۲ - عدم تمایل به برقراری ارتباط با دیگران و میل به تنها ماندن در خانه
- ۳ - زود عصبانی شدن و خلق گرفته

رفتارهای مشکوک کننده

۴ – نحوه لباس پوشیدن ، دکور اتاق و سلیقه موسیقی ، به طور ضمنی حاکی از مصرف مواد مخدر

۵ – عدم همکاری در خانه

۶ – رفتار فریب کارانه ، نظیر تظاهر به خوش رفتاری ، یا پرخاشگری برای وادار کردن والدین به انجام کاری که می خواهد

رفتارهای مشکوک کننده

۷ - بی علاقه‌گی به فعالیت‌های مورد علاقه سابق و جدایی از دوستان قدیمی

۸ تغییر ظاهر برای متفاوت به نظر رسیدن

۹ - عدم تمرکز ، بی‌نظمی و فراموش کاری

رفتارهای مشکوک کننده

- ۱۰ - بی علاقه بودن به مدرسه و کاهش سطح نمرات
- ۱۱ - تمرد علیه قوانین ، بحث وجدل بیشتر با اولیای امور
- ۱۲ - عدم تمایل به انجام فعالیت های خانوادگی

رفتارهای مشکوک کننده

- ۱۳ – خیالبافی وبی اعتنایی به واقعیت
- ۱۴ – توجه شدید به زمان حال وبی توجهی نسبت به آینده
- ۱۵ – امتناع از روبرو شدن بامسائل مورد علاقه والدین